




Disarm[®] Fongicide

Disarm est un fongicide du groupe 11 spécialement conçu pour offrir une protection contre plusieurs des maladies les plus destructrices du gazon. **Disarm** est un strobilurine à large spectre qui procure d'excellents résultats dans la lutte contre les principales maladies du gazon, y compris l'anthracnose, la plaque estivale, la moisissure des neiges et même la brûlure en plaques!!

Disarm offre un 'halo de protection' unique en son genre, résultat d'une absorption rapide par la plante puis d'une distribution uniforme. Ajoutez sa résistance au délavage en 15 minutes et vous comprendrez pourquoi **Disarm** est une solution exceptionnelle parmi les fongicides à base de strobilurine.



- Xylème et mouvement translaminaire
- Résistant au délavage en 15 minutes
- Absorption foliaire et racinaire

**MOBILITE
RAPIDE**

- Piétin-chaudage
- Plaque estivale
- Anthracnose
- Brûlure en plaques et plus

**MAITRISE
DES
MALADIES**

- Masse racinaire plus importante
- Production constante de chlorophylle

**SANTE
DES
PLANTES**



Matière active

Fluoxastrobin – 480 g ai/L

Groupe de fongicide

Group 11 – QoI

Formule

Suspension concentrée

Phytomobilité

Mobile dans le xylème ;
translaminaire

Conditionnement

4 x 1,4 L


Contactez-nous

Paul Grotier 647 225 8035 paul.grotier@belchim.com
Billy-Joe Carey 416 457 7785 billyjoe.carey@belchim.com
Barry Johnson 519 820 8929 barry.johnson@belchim.com




www.belchimturf.ca

Centre de recherche Belchim



Chicago District Golf Assoc. 2018, Townsend, Biery
Intervalle d'application de 28 jours, début le 4 mai.



Rutgers Univ. 2007, B. Clarke, Ph.D.
Intervalle d'application de 28 jours

Résumé de l'étiquette de Disarm

Maladies maîtrisées	Dose (/100 m ²)	Intervalle d'application	Volume d'eau (/100 m ²)
Anthracnose – brûlure foliaire	5,8 – 11,5 ml	14-28	4-8 L
Anthracnose – pourriture basale	11,5 ml	14-21	4-8 L
Plaque brune	5,8 – 11,5 ml	14-28	4-8 L
Brûlure en plaques	5,0 – 11,5 ml	14-21	4-8 L
Plaque estivale	5,8 – 11,5 ml	14-28	12-16 L
Piétin-échaudage du gazon	11,5 ml	28	12-16 L
Brunissure annulaire (plaque Waitea)	5,8 – 11,5 ml	14-21	4-8 L
Fonte et tache helminthosporienne	5,8 – 11,5 ml	14-21	4-8 L
Pythium (brûlure foliaire)	11,5 ml	7-14	4-8 L
Moisissures rose et grise des neiges	11,5 ml	n/a	4-8 L

Couverture d'une caisse

Dose recommandée (/100m ²)	1 bidon (1,4 L)	1 caisse (4 x 1,4 L)
5 ml	6,92 ac	27,68 ac
5,8 ml	5,96 ac	23,8 ac
11,5 ml	3,01 ac	12,04 ac

Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette.
Disarm & Xylem-Pro sont des marques déposées de FMC



Belchim Canada
GROWING TOGETHER