




Valor Herbicide

Formulation améliorée pour la lutte contre le bryum d'argent

L'herbicide Valor™ assure une lutte puissante et fiable contre le bryum d'argent grâce à une technologie de formulation de pointe, tout en restant exceptionnellement doux pour vos gazons les plus précieux.

Spécialement formulé pour offrir une faible odeur, une couverture améliorée, une réduction de la dérive et de la volatilité, ainsi qu'une excellente innocuité pour le gazon.



**Faible
odeur**

**Couverture
améliorée**

**Réduction en
volatilité**

**Excellente
innocuité**

Matières actives

Carfentrazone-éthyle 224 g/L

Groupe de d'herbicide

Groupe 14

Formule

Concentré émulsifiable

Phytomobilité

Contact

Format de l'emballage

4 x 240 ml

Contactez-nous

Paul Grotier 647 225 8035 paul.grotier@belchim.com
Billy-Joe Carey 416 457 7785 billyjoe.carey@belchim.com
Barry Johnson 519 820 8929 barry.johnson@belchim.com



www.belchimturf.ca

Recherche sur le bryum d'argent



Infestation initiale de bryum argenté
(27 mai 2025)



Valor - 2.1 ml/100 m² appliqué aux deux semaines
(20 août 2026)

Informations sur l'application de l'herbicide Valor

Maladies maîtrisées	Dose recommandée (aux 100 m ²)	Intervalle d'application	Volume d'eau (aux 100 m ²)	Maximum par saison (aux 100 m ²)
Bryum argent	1.46 - 4.9 ml	14 jours	8 L	19.6

- Appliquez l'herbicide Valor lorsque le gazon et la mousse sont en phase de croissance active, afin de permettre à l'agrostide d'envahir les zones où la mousse a été endommagée. Valor est plus efficace lorsqu'il est appliqué sur des tissus en photosynthèse ; veillez donc à ce que la mousse soit verte (et bien hydratée).
- Applications d'entretien : 1,46 à 2,45 ml/100 m².
- En cas de forte pression : respectez un calendrier d'application bimensuel à une dose faible ou modérée tout au long de la saison de croissance. Des études ont démontré une bonne efficacité avec des applications bimensuelles de 2,0 ml/100 m² sur toute la saison.
- Utilisez la dose maximale indiquée sur l'étiquette (4,9 ml/100 m²) lorsqu'un intervalle d'application plus long est nécessaire.
- La qualité de la couverture est importante, car Valor est un herbicide de contact :
 - Appliquez avec 8 L d'eau pour 100 m² (2 gallons/1000 pi²).
 - L'ajout d'un tensioactif non ionique à une concentration de 0,25 % (v/v) peut améliorer la couverture et l'efficacité.

Gestion culturale et sursemis

- Une bonne gestion des pratiques culturales, notamment la fertilisation, l'irrigation et la hauteur de tonte, est essentielle pour lutter contre le bryum d'agent. Dans l'idéal, appliquez l'herbicide Valor sept jours après les interventions culturales susceptibles de perturber le couvert végétal et de propager la mousse (aération, scarification, etc.).
- L'herbicide Valor peut être appliqué sur l'agrostide stolonifère 7 jours ou plus après la levée.
- Les zones traitées avec l'herbicide Valor peuvent être ensemencées ou sursemencées un jour après l'application.
- Favorisez les populations d'agrostide par un sursemis après l'application de Valor.

Couverture par caisse

Dose recommandée (aux 100 m ²)	# d'app/saison	1 bidon (240 ml)		1 Caisse (4 x 240 ml)	
1.46 ml	13.4	4.06 ac	1.64 ha	16.2 ac	6.57 ha
1.95 ml	10	3.04 ac	1.23 ha	12.2 ac	4.92 ha
4.9 ml	4	1.21 ac	0.49 ha	4.8 ac	1.96 ha