


DISARM^{MD}

DISARM^{MD} est un fongicide du groupe 11 avec la technologie Xylem-Pro^{MD}, spécialement conçu pour offrir une protection contre plusieurs des maladies les plus destructrices du gazon. DISARM est un strobilurine à large spectre qui procure d'excellents résultats dans la lutte contre les principales maladies du gazon, y compris l'antracnose, le piétin-échaudage, la moisissure des neiges et même la brûlure en plaques!

DISARM offre un « halo de protection » unique en son genre, résultat d'une absorption rapide par la plante puis d'une distribution uniforme. Ajoutez sa résistance au délavage en 15 minutes et vous comprendrez pourquoi DISARM est une solution exceptionnelle parmi les fongicides à base de strobilurine.



- *Xylème et mouvement translaminaire*
- *Résistant au délavage en 15 minutes*
- *Absorption par les racines et*

**MOBILITE
RAPIDE**


- *Piétin-chaudage*
- *Plaque estivale*
- *Antracnose*
- *Brûlure en plaques et plus*

**MAITRISE
DES
MALADIES**


- *Masse racinaire plus importante*
- *Production constante de chlorophylle*

**SANTE DES
PLANTES**

Matière active
Fluoxastrobine – 480 g m.a./L
Groupe de fongicide
Groupe 11 – QoI
Formule
Suspension concentrée
Phytomobilité
Mobile dans le xylème ; translaminaire
Conditionnement
4 x 1.4 L



Chicago District Golf Assoc. 2018, Townsend, Biery
Intervalle d'application de 28 jours, début le 4 mai.



Rutgers Univ. 2007, B. Clarke, Ph.D.
Intervalle d'application de 28 jours

Résumé de l'étiquette de Disarm

Maladies maîtrisées	Dose (/100 m ²)	Intervalle d'application	Volume d'eau (/100 m ²)
Anthracnose – brûlure foliaire	5,8 – 11,5 ml	14-28 jours	4-8 L
Anthracnose – pourriture basale	11,5 ml	14-21 jours	4-8 L
Plaque brune	5,8 – 11,5 ml	14-28 jours	4-8 L
Brûlure en plaques	5,0 – 11,5 ml	14-21 jours	4-8 L
Plaque estivale	5,8 – 11,5 ml	14-28 jours	12-16 L
Piétin-échaudage du gazon	11,5 ml	28 jours	12-16 L
Brunissure annulaire (plaque Waitea)	5,8 – 11,5 ml	14-21 jours	4-8 L
Fonte et tache helminthosporienne	5,8 – 11,5 ml	14-21 jours	4-8 L
Pythium (brûlure foliaire)	11,5 ml	7-14 jours	4-8 L
Moisissures rose et grise des neiges	11,5 ml	n/a	4-8 L

Couverture d'une caisse

Dose recommandée (/100m ²)	1 bidon (1,4 L)	1 caisse – 4 x 2 L (4 x 1,4 L)
5 ml	6,92 acres	27,68 acres
5,8 ml	5,96 acres	23,8 acres
11,5 ml	3,01 acres	12,04 acres



Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette.
Disarm & Xylem-Pro sont des marques déposées de FMC